

Prospect: Informații pentru consumator / pacient

Artihol comprimate filmate

extract uscat de anghinare

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste câteva nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Artihol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Artihol
3. Cum să utilizați Artihol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Artihol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Artihol și pentru ce se utilizează

Artihol este un medicament ce conține extract uscat de anghinare.

Artihol se utilizează pentru ameliorarea tulburărilor digestive funcționale, precum plinătatea, balonarea și flatulența.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Artihol

Nu utilizați Artihol:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la plantele din familia Asteraceae (Asteraceae) sau la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți obstrucția tractului biliar, colangită, supurație (empie) a vezicii biliare, a bolii biliare sau a altor boli ale tractului biliar, boli hepatice acute, insuficiență hepatică severă;
- dacă aveți obstrucție urinară, boli renale acute;

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Artihol, dacă:

- aveți boală care pot duce la obstrucția tractului biliar și în boli hepatice severe;
- suferiți de diaree sau durere abdominală.

Aplicarea în scopurile indicate se bazează numai pe experiența în utilizare continuă.

Artihol împreună cu alte medicamente

Necunoscută.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

În timpul sarcinii sau alăptării, medicamentul trebuie utilizat numai așa cum este prescris de medic, dacă beneficiul preconizat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau copil.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu afectează rata de reacție atunci când trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

3. Cum să utilizați Artihol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Se aplică la adulți și copii peste 12 ani. Luați înainte de masă.

Adulți și copii peste 12 ani: 200-400 mg de 3 ori pe zi.

Cursul tratamentului este determinat de medic individual, în funcție de natura și cursul bolii. De regulă, cursul tratamentului este de 2-3 săptămâni. Cursurile repetate de tratament sunt posibile după consultarea medicului.

Copii. Nu se indică la copiii sub 12 ani la indicațiile medicului

Dacă utilizați mai mult Artihol decât trebuie

În caz de supradozare adresați-vă imediat la medic. Acordarea rapidă a ajutorului medical este critic important, chiar dacă nu se observă nici un semn sau simptom.

Foarte rare: diaree, precum și crampe abdominale, indigestie, greață, arsuri la stomac, reacții alergice, inclusiv urticarie, erupții cutanate, hiperemie, mâncărime.

Dacă uitați să utilizați Artihol

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Artihol

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar aceste reacții adverse grave, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la secția de urgență a celui mai apropiat spital:

- diaree, precum și crampe abdominale, indigestie, greață, arsuri la stomac
- reacții alergice, inclusiv urticarie, erupții cutanate, hiperemie, mâncărime.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin sistemului național de raportare, ale cărui detalii

sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Artihol

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Artihol

Substanțele active sunt: conține extract uscat de anghinare 200 mg.

Celelalte componente sunt: oxid de magneziu greu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, amidon de porumb, talc, stearat de magneziu;

Filmul: opadry 200 amestec de acoperire cu peliculă brună: alcool polivinilic, talc, dioxid de titan (E 171), polietilenglicol, oxid galben de fier (E 172), oxid roșu de fier (E 172), oxid de fier negru (E 172), copolimer de metacrilat (tip C), bicarbonat de sodiu.

Cum arată Artihol și conținutul ambalajului

Artihol se prezintă sub formă de comprimate rotunde biconvexe, acoperite cu un strat de film maro deschis.

Artihol este disponibil câte 10 comprimate în blister PVC/AL. Câte 3 blistere împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Uzina de vitamine din Kiev SA, 04073,
or. Kiev, str. Kopîlovskaya, 38, Ucraina.

Fabricantul

Uzina de vitamine din Kiev SA, 04073,
or. Kiev, str. Kopîlovskaya, 38, Ucraina.

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2021.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>