

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Bactavit 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluție

Picloxidină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Bactavit și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bactavit
3. Cum să utilizați Bactavit
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Bactavit
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Bactavit și pentru ce se utilizează

Tratamentul antiseptic al infecțiilor superficiale ale ochiului și anexelor acestuia.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bactavit

Nu utilizați Bactavit în următoarele cazuri, așadar adresați-vă medicului dumneavoastră:

- dacă sunteți alergic la picloxidină sau la sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);

Atenționări și precauții

Durata tratamentului, de regulă, nu depășește 10 zile. În caz contrar, conduita terapeutică trebuie reevaluată.

Bactavit împreună cu alte medicamente

Dacă se utilizează concomitent un alt medicament cu administrare topică oftalmică, se recomandă păstrarea unui interval de 15 minute între administrările acestora.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Datele provenite din utilizarea picloxidinei la femeile gravide sau care alăptează sunt inexistente sau limitate.

Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Bactavit 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluție în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Un disconfort vizual tranzitoriu poate fi resimțit după instilarea picăturilor pentru ochi. În acest caz, pacientul trebuie să aștepte până când vederea revine la normal înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Bactavit

Infecții oculare: 1 picătură de 2 până la 6 ori pe zi.

4. Reacții adverse posibile

Pot apărea reacții de intoleranță locală (iritație sau sensibilizare).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Bactavit

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. Nu utilizați acest medicament după data

de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C în ambalajul original.

Nu folosiți medicamentul mai mult de 28 de zile după prima deschidere a flaconului.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să

aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Bactavit

- Substanța activă este picloxină. Un mililitru soluție conține picloxină 0,5 mg.
- Celelalte componente sunt: glucoză anhidră, polisorbitat 80, apă purificată.

Cum arată Bactavit și conținutul ambalajului

Bactavit se prezintă sub formă de soluție limpede, practic lipsită de impurități mecanice, incoloră până la slab gălbuie.

Cutie cu un flacon din polietilenă, de capacitate 10 ml picături oftalmice, soluție, prevăzut cu dop picurător transparent și închis cu capac alb cu inel de siguranță din polietilenă.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

LLC Rompharm Company Georgia

Georgia, Tbilisi, Saakadze Downhill N8, office N7a

Fabricantul

S.C. Rompharm Company S.R.L.
Str. Eroilor, nr. 1A, Otopeni, 075100, jud. Ilfov
România

Acest prospect a fost aprobat în Iulie 2023.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>