

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### MENOVAZIN-MC 25 mg/10 mg/10 mg/ml soluție cutanată

*levomentol*  
*clorhidrat de procaină*  
*benzocaină*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Menovazin-MC și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Menovazin-MC
3. Cum să luați Menovazin-MC
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Menovazin-MC
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Menovazin-MC și pentru ce se utilizează**

Menovazin-MC este un medicament, care conține 3 substanțe active: levomentol, benzocaină și procaină. Mentolul irită slab pielea și manifestă acțiune revulsivă moderată, iar procaina și benzocaina posedă efect anestezic local.

Menovazin-MC se utilizează în dureri pe parcursul nervilor (nevralgii), dureri musculare (mialgii), dureri articulare (artralgii), inflamația pielii de diversă origine, însoțită de mâncărime (dermatită pruriginoasă).

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Menovazin-MC**

##### **Nu utilizați Menovazin-MC**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la alte componente ale medicamentului enumerate la pct. 6;
- dacă aveți leziuni ale pielii la locul aplicării;
- dacă aveți inflamații ale pielii la locul aplicării;
- dacă sunteți gravidă sau alăptați.

##### **Atenționări și precauții**

Se recomandă testarea sensibilității individuale la preparat.

Se recomandă utilizarea cu precauție la pacienții vârstnici și copii și adolescenți cu vârsta până la 18 ani.

A se aplica numai pe suprafețe limitate. Nu se recomandă utilizarea în cavitățile organismului.

A se evita contactul soluției cu mucoasa oculară și alte mucoase. În caz de nimerire a preparatului în ochi, se vor spăla din abundență cu apă.

După utilizarea medicamentului se recomandă spălarea mâinilor.

##### **Menovazin-MC împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Efectul tratamentului poate fi modificat dacă Menovazin-MC este utilizat în același loc cu alte medicamente ce conțin anestezice locale. Menovazin-MC poate reduce efectul sulfanilamidelor, utilizate în caz de infecții.

### **Menovazin-MC împreună cu alimente și băuturi**

Menovazin-MC se utilizează cutanat.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Medicamentul este contraindicat în sarcină și în perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Preparatul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

## **3. Cum să utilizați Menovazin-MC**

Utilizați întotdeauna Menovazin-MC exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### Mod de utilizare

Utilizare cutanată.

Se aplică topic pe porțiunile dureroase ale pielii de 2-3 ori pe zi, masând ușor.

Durata curei de tratament este în funcție de efectul atins, dar nu mai mare de 3-4 săptămâni.

### **Dacă luați mai mult Menovazin-MC decât trebuie**

În caz de ingestie accidentală se recomandă să vă adresați medicului sau să mergeți la departamentul de urgențe al celui mai apropiat spital. În caz de utilizare îndelungată este posibilă agravarea reacțiilor adverse (reacții alergice, inflamația pielii la locul aplicării, amețeli, slăbiciune, scăderea tensiunii arteriale).

### **Dacă uitați să luați Menovazin-MC**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Dacă încetați să luați Menovazin-MC**

Puteți opri utilizarea Menovazin-MC după dispariția simptomelor.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată reieșind din datele disponibile)*

Reacții alergice, inflamația pielii la locul de aplicare (dermatită de contact), amețeli, slăbiciune generală, scăderea tensiunii arteriale.

### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în acest prospect. Puteți raporta, de asemenea, reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, disponibil pe site-ul AMDM la următoarea adresă web: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau prin e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Prin raportarea efectelor adverse veți ajuta la furnizarea mai multor informații cu privire la siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Menovazin-MC**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Menovazin–MC după data de expirare înscrisă pe cutie după “Exp:”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Menovazin-MC**

Substanțele active sunt levomentolul, benzocaina, procaina.

1 ml soluție cutanată conține levomentol 25 mg, benzocaină 10 mg, clorhidrat de procaină 10 mg.

Celelalte componente sunt: alcool etilic 70%.

#### **Cum arată Menovazin-MC**

Lichid transparent, incolor sau cu nuanță slab gălbuie, cu miros caracteristic de mentol și alcool etilic. Este disponibil câte 40 ml în flacon din sticlă sau masă plastică de culoare brună, acoperite cu capac cu dop cu picurător, cu sau fără inel de fixare. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Se admite ambalarea directă a flacoanelor însoțite de prospect în cutie colectivă, fără ambalare în cutie individuală.

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

##### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chisinau, str. Industrială 59/3

e-mail: [office@mcpharma.md](mailto:office@mcpharma.md)

tel.: +373 680 51 605

##### **Fabricantul**

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chisinau, str. Industrială 59/3

**Acest prospect a fost aprobat în Decembrie 2024.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>