

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Etoricoxib STADA 60 mg comprimate filmate

Etoricoxib STADA 90 mg comprimate filmate

Etoricoxib

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Etoricoxib STADA și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Etoricoxib STADA
3. Cum să luați Etoricoxib STADA
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Etoricoxib STADA
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Etoricoxib STADA și pentru ce se utilizează

Ce este Etoricoxib STADA?

- Etoricoxib STADA conține substanța activă etoricoxib. Etoricoxibul face parte dintr-un grup de medicamente denumite inhibitori selectivi de COX-2. Acestea aparțin unei clase de medicamente denumite medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

Pentru ce se utilizează Etoricoxib STADA?

- Etoricoxib STADA ajută la reducerea durerii și tumefacției (inflamației) de la nivelul articulațiilor și mușchilor la persoane cu vârsta de 16 ani și peste, cu osteoartroză, poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă și gută.
- Etoricoxib STADA este utilizată și pentru tratamentul de scurtă durată al durerii de intensitate moderată apărută după intervențiile chirurgicale dentare, la persoane cu vârsta de 16 ani și peste.

Ce este osteoartroza?

Osteoartroza este o boală a articulațiilor. Ea este determinată de distrugerea gradată a cartilajelor care protejează extremitățile oaselor. Aceasta produce tumefacție (inflamație), durere, sensibilitate, blocare articulară și impotență funcțională.

Ce este poliartrita reumatoidă?

Poliartrita reumatoidă este o boală inflamatoare pe termen lung a articulațiilor. Aceasta produce durere, blocare articulară, tumefacție, cu reducerea progresivă a mișcării în articulațiile pe care le afectează. Ea poate produce, de asemenea, inflamație la nivelul altor zone ale corpului.

Ce este guta?

Guta este o boală caracterizată prin accese bruște, recurente de inflamație foarte dureroasă și înroșire la nivelul articulațiilor. Ea este provocată de depozitarea de cristale minerale în articulație.

Ce este spondilita anchilozantă?

Spondilita anchilozantă este o afecțiune inflamatoare la nivelul coloanei vertebrale și articulațiilor mari.

Ce trebuie să știți înainte să luați Etoricoxib STADA

Nu luați Etoricoxib STADA:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la etoricoxib sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6);
- dacă sunteți alergic la medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inclusiv acid acetilsalicilic și inhibitori de COX-2 (vezi *Reacții adverse posibile*, punctul 4);
- dacă aveți în prezent un ulcer gastric sau sângerări gastrice sau intestinale;
- dacă aveți boală hepatică gravă;
- dacă aveți boală renală gravă;
- dacă sunteți sau ați putea fi gravidă sau dacă alăptați (vezi „*Sarcina, alăptarea și fertilitatea*”);
- dacă aveți vârsta sub 16 ani;
- dacă aveți boală inflamatoare intestinală, cum este boala Crohn, colita ulcerativă sau colita;
- dacă aveți hipertensiune arterială care nu este controlată prin tratament (verificați împreună cu medicul dumneavoastră sau asistenta în cazul în care nu sunteți sigur dacă tensiunea dumneavoastră arterială este controlată adecvat);
- dacă medicul dumneavoastră v-a diagnosticat cu probleme cardiace inclusiv insuficiență cardiacă (formă moderată sau severă), angină pectorală (durere în piept);
- dacă ați avut în trecut infarct miocardic, bypass chirurgical, boală arterială periferică (circulație deficitară la nivelul gambelor sau picioarelor din cauza arterelor îngustate sau blocate);
- dacă ați avut în trecut orice fel de accident vascular cerebral (inclusiv accident vascular cerebral minor sau accident ischemic tranzitoriu). Etoricoxibul vă poate crește ușor riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral și, de aceea, nu trebuie utilizat la cei care au avut deja tulburări cardiace sau accident vascular cerebral.

Dacă credeți că vă aflați în oricare dintre aceste situații, nu utilizați comprimatele până nu discutați cu medicul dumneavoastră.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Etoricoxib STADA, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- Aveți istoric de hemoragie gastrică sau de ulcere;
- Sunteți deshidratat, de exemplu datorită unui acces prelungit de vărsături sau diaree;
- Prezența edeme datorită retenției de lichide;
- Aveți istoric de insuficiență cardiacă sau orice altă formă de boală cardiacă;
- Aveți istoric de hipertensiune arterială. Etoricoxib STADA, în special când este administrat în doze mari, poate crește tensiunea arterială la unii pacienți, iar, din când în când, poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă verifice tensiunea arterială;
- Aveți istoric de boală hepatică sau renală;
- Sunteți în tratament pentru o infecție. Etoricoxib STADA poate masca sau ascunde febra, care este un semn al infecției;
- Aveți diabet zaharat, valori crescute ale colesterolului sau fumați. Acestea pot crește riscul dumneavoastră de boală cardiacă;

- Sunteți o femeie care încearcă să rămână gravidă;
- Aveți vârsta peste 65 ani.

În cazul în care nu sunteți sigur dacă vă aflați în oricare dintre situațiile de mai sus, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua Etoricoxib STADA pentru a vedea dacă acest medicament este potrivit pentru dumneavoastră.

Etoricoxib STADA este la fel de eficace atât la pacienții vârstnici, cât și la adulții mai tineri. Dacă aveți vârsta peste 65 ani, medicul dumneavoastră va dori să vă urmărească corespunzător. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu vârsta peste 65 ani.

Copii și adolescenți

Nu dați acest medicament copiilor și adolescenților cu vârsta sub 16 ani.

Etoricoxib STADA împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Este posibil să fie necesar ca medicul dumneavoastră să vă urmărească îndeaproape, pentru a verifica dacă medicamentele pe care le luați acționează adecvat, îndeosebi dacă luați vreunul dintre medicamentele enumerate mai jos:

- medicamente care vă subțiază sângele (anticoagulante), cum este warfarina;
- rifampicină (un antibiotic);
- metotrexat (un medicament utilizat pentru supresia sistemului imun, folosit adesea în poliartrita reumatoidă);
- ciclosporină sau tacrolimus (medicamente utilizate pentru supresia sistemului imun);
- litiu (un medicament utilizat pentru tratamentul anumitor tipuri de depresie);
- medicamente utilizate pentru controlul hipertensiunii arteriale și insuficienței cardiace denumite inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA) și antagoniști ai receptorilor de angiotensină, exemplele incluzând enalapril și ramipril, losartan și valsartan;
- diuretice (medicamente care cresc eliminarea apei din organism);
- digoxină (un medicament pentru tratamentul insuficienței cardiace și aritmiilor cardiace);
- minoxidil (un medicament utilizat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale);
- salbutamol sub formă de comprimate sau soluție orală (un medicament pentru astm bronșic);
- comprimate contraceptive (administrarea concomitentă vă poate crește riscul de apariție a reacțiilor adverse);
- terapie de substituție hormonală (administrarea concomitentă vă poate crește riscul de apariție a reacțiilor adverse);
- acid acetilsalicilic, riscul de ulcere gastrice fiind mai mare dacă luați Etoricoxib STADA împreună cu acid acetilsalicilic:
 - *acid acetilsalicilic pentru prevenirea infarctului miocardic sau accidentului vascular cerebral*: Etoricoxib STADA poate fi luat împreună cu doze mici de acid acetilsalicilic. Dacă în prezent luați doze mici de acid acetilsalicilic pentru a preveni infarctele miocardice sau accidentul vascular cerebral, nu trebuie să opriți administrarea acestuia fără să discutați în prealabil cu medicul dumneavoastră.
 - *acid acetilsalicilic și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS)*: nu utilizați doze mari de acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare în timpul tratamentului cu Etoricoxib STADA.

Etoricoxib STADA împreună cu alimente

Efectul medicamentului poate avea un debut mai rapid atunci când Etoricoxib STADA este administrat fără alimente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sarcina

Comprimatele de Etoricoxib STADA nu trebuie administrate în timpul sarcinii. Nu luați comprimatele dacă sunteți gravidă sau credeți că ați putea fi gravidă, sau dacă intenționați să rămâneți gravidă. Dacă rămâneți gravidă, întrerupeți administrarea comprimatelor și informați medicul dumneavoastră. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă nu sunteți sigură sau dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă Etoricoxib STADA se excretă prin laptele uman. Dacă alăptați sau intenționați să alăptați, informați medicul dumneavoastră înainte de a lua Etoricoxib STADA. În cazul în care utilizați Etoricoxib STADA, nu trebuie să alăptați.

Fertilitatea

Etoricoxib STADA nu este recomandat la femeile care încearcă să rămână gravide.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

La unii pacienți care utilizează Etoricoxib STADA s-au raportat amețeli și somnolență.

În cazul în care prezentați amețeli sau somnolență, nu trebuie să conduceți vehicule.

În cazul în care prezentați amețeli sau somnolență, nu trebuie să folosiți niciun fel de unelte sau utilaje.

Etoricoxib STADA conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la anumite categorii de glucide, vă rugăm să îl întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

Etoricoxib STADA conține sodiu

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”.

3. Cum să luați Etoricoxib STADA

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Nu luați mai mult decât doza recomandată pentru afecțiunea dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va dori să discutați tratamentul din când în când. Este important să utilizați cea mai mică doză care controlează durerea și nu trebuie să luați Etoricoxib STADA pentru mai mult timp decât este necesar. Acest lucru este din cauza faptului că riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral poate să crească după tratament prelungit, în special cu doze mari.

Există diferite concentrații disponibile pentru acest medicament și, în funcție de boală, medicul dumneavoastră va prescrie comprimatul cu concentrația potrivită pentru dumneavoastră.

Doza recomandată este:

Osteoartroză

Doza recomandată este de 30 mg o dată pe zi, crescând până la maxim 60 mg o dată pe zi, dacă este necesar.

Poliartrită reumatoidă

Doza recomandată este de 60 mg o dată pe zi, crescând până la maxim 90 mg o dată pe zi, dacă este necesar.

Spondilită anchilozantă

Doza recomandată este de 60 mg o dată pe zi, crescând până la maxim 90 mg o dată pe zi, dacă este necesar.

Afecțiuni dureroase acute

Etoricoxib trebuie utilizat doar pentru perioada dureroasă acută.

Gută

Doza recomandată este de 120 mg o dată pe zi, care trebuie administrată doar în perioada dureroasă acută, limitată la o perioadă maximă de 8 zile de tratament.

Dureri după intervenții chirurgicale dentare

Doza recomandată este de 90 mg o dată pe zi, limitată la o perioadă maximă de 3 zile de tratament.

Persoane cu probleme ale ficatului

- Dacă aveți boală hepatică ușoară, nu trebuie să utilizați mai mult de 60 mg pe zi.
- Dacă aveți boală hepatică **moderată**, nu trebuie să utilizați mai mult de 30 mg pe zi.

Utilizarea la copii și adolescenți

Comprimatele de Etoricoxib STADA nu trebuie luate de către copii sau adolescenți cu vârsta sub 16 ani.

Vârstnici peste 65 ani

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu vârsta peste 65 ani. Ca și în cazul altor medicamente, este necesară prudență la pacienții vârstnici.

Mod de administrare

Etoricoxib STADA se administrează pe cale orală.

Luați comprimatele o dată pe zi. Etoricoxib STADA poate fi utilizat cu sau fără alimente.

Dacă luați mai mult Etoricoxib STADA decât trebuie

Nu trebuie să luați niciodată mai multe comprimate decât v-a recomandat medicul dumneavoastră. În cazul în care luați prea multe comprimate de Etoricoxib STADA, trebuie să solicitați imediat asistență medicală.

Dacă uitați să luați Etoricoxib STADA

Este important să luați Etoricoxib STADA așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Dacă uitați să luați o doză, urmați tratamentul în continuare conform schemei recomandate. Nu luați o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați oricare dintre aceste semne, trebuie să opriți administrarea Etoricoxib STADA și să discutați imediat cu medicul dumneavoastră (vezi pct. 2 Ce trebuie să știți înainte să luați Etoricoxib STADA):

- apar sau se agravează respirația dificilă, durerile în piept sau umflarea gleznelor;
- colorare în galben a pielii și a albului ochilor (icter) – acestea sunt semne ale afecțiunilor hepatice;
- dureri de stomac severe sau continue sau scaunele dumneavoastră devin de culoare neagră;
- reacție alergică – care poate include afecțiuni pe piele cum sunt ulceratii sau vezicule, sau umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului care poate determina dificultăți în respirație.

Următoarele reacții adverse pot să apară în timpul tratamentului cu Etoricoxib STADA:

Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):

- dureri la nivelul stomacului.

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- alveolită uscată (inflamație și durere după extracție dentară);
- tumefacția picioarelor și/sau a gambelor datorată retenției de lichide (edeme);
- amețeli, cefalee;
- palpitații (bătăi rapide sau neregulate ale inimii), ritm cardiac neregulat (aritmii);
- tensiune arterială crescută;
- respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație (bronhospasm);
- constipație, flatulență (gaze intestinale în exces), gastrită (inflamație a mucoasei gastrice), arsuri în capul pieptului, diaree, indigestie (dispepsie)/disconfort la nivelul stomacului, greață, stare de rău (vărsături), inflamația esofagului, ulceratii bucale;
- modificări ale testelor sanguine legate de starea ficatului;
- vânătași;
- stare de slăbiciune și oboseală, boală asemănătoare gripei.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- gastroenterită (inflamația tractului gastrointestinal care afectează atât stomacul cât și intestinul subțire/probleme la nivelul stomacului), infecții la nivelul căilor respiratorii superioare, infecții ale tractului urinar;
- scădere a numărului de celule roșii din sânge, scădere a numărului de celule albe din sânge, scădere a numărului de trombocite din sânge;
- hipersensibilitate (o reacție alergică incluzând blânde care pot fi atât de severe încât să necesite asistență medicală de urgență);
- creșteri sau scăderi ale poftei de mâncare, creștere în greutate;
- anxietate, depresie, scăderea acuității mentale; senzația de a vedea, simți sau auzi lucruri care nu există în realitate (halucinații);
- modificarea gustului, insomnie, senzație de amorțeală sau furnicături, somnolență;
- vedere încețoșată, iritație și înroșire la nivelul ochilor;
- senzație de țuitori în urechi, vertij (senzație de rotire în timp ce stai nemișcat);
- ritm cardiac anormal (fibrilație atrială), bătăi rapide ale inimii, insuficiență cardiacă, senzație de apăsare, presiune sau greutate în piept (angină pectorală), infarct miocardic;

- scădere a numărului de celule roșii din sânge, scădere a numărului de celule albe din sânge, scădere a numărului de trombocite din sânge;
- tuse, dificultate în respirație, sângerare nazală;
- balonare la nivelul stomacului sau intestinului, scădere a numărului de celule roșii din sânge, scădere a numărului de celule albe din sânge, scădere a numărului de trombocite din sânge inflamație a pancreasului;
- umflarea feței, erupții cutanate sau mâncărimi ale pielii, înroșirea pielii;
- crampe/spasme musculare, dureri/rigiditate musculară;
- valori crescute ale potasiului în sânge, modificări în sânge sau urină ale testelor legate de starea rinichilor, afecțiuni renale grave;
- dureri în piept.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- angioedem (o reacție alergică constând în umflarea feței, buzelor, limbii și/sau a gâtului care poate determina dificultăți în respirație sau la înghițire, și care poate fi atât de severă încât să necesite asistență medicală de urgență)/reacție anafilactică/anafilactoidă inclusiv șoc (o reacție alergică gravă ce necesită asistență medicală de urgență);
- confuzie, agitație;
- probleme cu ficatul (hepatită);
- valori scăzute ale sodiului în sânge;
- insuficiență hepatică, colorare în galben a pielii și/sau a albului ochilor (icter);
- reacții severe la nivelul pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Etoricoxib STADA

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Etoricoxib STADA

Substanța activă este etoricoxibul.

- Etoricoxib Stada 60 mg: Fiecare comprimat filmat conține etoricoxib 60 mg.
- Etoricoxib Stada 90 mg: Fiecare comprimat filmat conține etoricoxib 90 mg.

Celelalte componente sunt: nucleu: hidrogenofosfat de calciu, celuloză microcristalină, povidonă K29-32, stearat de magneziu, croscarmeloză sodică; *film:* hipromeloză, lactoză monohidrat, dioxid de titan (E171), triacetină.

Comprimatele de Etoricoxib Stada 60 mg conțin și oxid galben de fer (E172) și indigotină lac de aluminiu (E132).

Cum arată Etoricoxib STADA și conținutul ambalajului

Etoricoxib STADA 60 mg se prezintă sub formă de comprimatele filmate de culoare verde închis, rotunde, biconvexe.

Etoricoxib STADA 90 mg se prezintă sub formă de comprimatele filmate de culoare albă, rotunde, biconvexe.

Etoricoxib STADA este disponibil în cutii cu 2 blistere câte 14 comprimate filmate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Laboratorio STADA, S.L.,
Frederic Mompou 5,
08960 Sant Just Desvern (Barcelona),
Spania.

Fabricantul

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.,
17 Athinon Street, Ergates Industrial Area,
2643 Ergates, Lefkosia,
Cipru.

Acest prospect a fost aprobat în Decembrie 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>