Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient

Lacto-G Forte capsule

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 2 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Lacto-G Forte şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Lacto-G Forte
3. Cum să luaţi Lacto-G Forte
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Lacto-G Forte
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Lacto-G Forte şi pentru ce se utilizează
Lacto-G Forte este un medicament, care reglează microflora intestinală.
Bifidobacteriile şi lactobacilii din componenţa medicamentului menţin şi restabilesc echilibrul fiziologic al microflorei intestinale.

Lacto-G Forte se utilizează în:
- profilaxia şi tratamentul tulburărilor echilibrului microflorei intestinale – disbacteriozei (de exemplu, în sindromul intestinului iritat);
- disbacterioze la adulţi şi copii, determinate de administrarea antibioticelor şi remediilor chimioterapice;
- diaree, balonarea abdomenului (meteorism), constipaţii (terapie adjuvantă);
- inflamaţia intestinului (colite şi gastroenterocolite acute şi cronice) (terapie adjuvantă).

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Lacto-G Forte
Nu luaţi Lacto-G Forte în cazul:
- dacă aveţi alergie (hipersensibilitate) la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenţionări şi precauţii
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Lacto-G Forte.

Copiilor cu vârsta sub 6 ani tratamentul diareei se va efectua sub supravegherea medicului.
Dacă simptomele diareei persistă după 2 zile de tratament, e necesar să vă adresați la medic.
În caz de diaree e necesar să acordați o atenţie deosebită restituirii lichidului şi sărurilor pierdute.

Lacto-G Forte împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripţie medicală.

Nu sunt înregistrate interacţiuni nefavorabile ale Lacto-G Forte cu alte medicamente.
Pentru sporirea eficacităţii medicamentului se recomandă de administrat Lacto-G Forte peste 3 ore după administrarea antibioticelor şi chimioterapicelor.

Lacto-G Forte împreună cu alimente, băuturi şi alcool
Lacto-G Forte se administrează pe nemâncate sau înainte de luarea mesei, cu o cantitate mică de lichid.
Pe durata tratamentului nu se recomandă consumul alcoolului.

Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

La necesitate, Lacto-G Forte poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării conform indicaţiilor.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Administrarea de Lacto-G Forte nu influenţează asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să luaţi Lacto-G Forte

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Copiilor cu vârsta sub 2 ani se administrează conţinutul unei capsule, amestecat cu o cantitate mică de lichid (suc, apă îndulcită), până la mese.
Copiilor cu vârsta de 2-12 ani se administrează câte 1-2 capsule pe zi până la mese, cu o cantitate mică de lichid.
*Adulţilor şi copiilor cu vârsta peste 12 an*i se administrează câte 2-3 capsule pe zi pe nemâncate sau până la mese, cu o cantitate mică de lichid.
Durata tratamentului este determinată de medic, în funcție de etiologia disbacteriozei şi particularităţile individuale ale organismului.

Dacă luaţi mai mult Lacto-G Forte decât trebuie
Nu sunt date privind supradozajul cu aceste medicament.
În caz de supradozaj adresaţi-vă imediat la medic.

Dacă uitaţi să luaţi Lacto-G Forte
Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi-o imediat ce vă aduceţi aminte. Dacă se apropie momentul următoarei doze, nu luaţi o doză dublă, ci continuaţi să administraţi medicamentul după cum e recomandat, respectând intervalele obişnuite între prize.

Dacă încetaţi să luaţi Lacto-G Forte
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Medicamentul, de regulă, este bine tolerat.
La administrarea în doze recomandate reacţii adverse nu au fost semnalate.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Lacto-G Forte
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25 ºC, în ambalajul original.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncaţi nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Lacto-G Forte
1 capsulă conţine:
- *Substanţe active:*
  Lactobacillus acidophilus – 37,25 mg – nu mai puţin de $2,5x10^9$ CFU;
  Bifidobacterium longum – 8,75 mg;
  Bifidobacterium bifidum – 8,75 mg;
  Bifidobacterium lactis – 8,75 mg;
  cantitatea sumară de bifidobacterii nu mai puţin de $2,5x10^9$ CFU.
  Masa totală de bacterii – 63,50 mg – nu mai puţin de $5x10^9$ CFU.
- *Celelalte componente sunt:* fructooligozaharide, maltodextrină de orez, stearat de magneziu.
  Compoziția capsulei: polizaharide.

Cum arată Lacto-G Forte şi conţinutul ambalajului
Lacto-G Forte se prezintă sub formă de capsule tari nr. 0 cu căpăcel şi corp transparente.
Conţinutul capsulei: pulbere albă cu incluziuni gălbui.

Lacto-G Forte este disponibil în cutii cu 1 blister a câte 10 capsule.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricanții
Deţinătorul certificatului de înregistrare
GM Pharmaceuticals Ltd.,
Rustavi Highway 52, Tbilisi, 0114, Georgia.

Fabricanții
GM Pharmaceuticals Ltd.,
Rustavi Highway 52, Tbilisi, 0114, Georgia.

UAS Laboratories LLC,
555 North 72nd Avenue,
Wausau, WI 54401, SUA.

Acest prospect a fost revizuit în August 2024.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/