Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient

Mercazolil-Zdorovie 5 mg comprimate
Thiamazolum

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Mercazolil-Zdorovie şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Mercazolil-Zdorovie
3. Cum să utilizaţi Mercazolil-Zdorovie
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Mercazolil-Zdorovie
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Mercazolil-Zdorovie şi pentru ce se utilizează

Mercazolil-Zdorovie este un medicament, care conţine tiamazol. El controlează producerea în exces de hormoni tiroidieni, la nivelul glandei tiroide, indiferent de cauză.

Mercazolil-Zdorovie este utilizat pentru a trata producerea în exces de hormoni tiroidieni:
- dacă aveţi nevoie să luaţi un medicament pentru tratamentul glandei tiroide, care funcţionează în exces, în special dacă aveţi o guşă mică (o umflătură în faţa gâtului) sau nu aveţi guşă,
- dacă urmează să vi se efectueze o operaţie la glanda tiroidă,
- dacă urmează să vi se efectueze un tratament care utilizează iod radioactiv, în special în cazurile severe de producere în exces de hormoni tiroidieni,
- după tratamentul cu iod radioactiv, până când efectul iodului radioactiv s-a stabilizat total.

De asemenea, Mercazolil-Zdorovie este utilizat pentru prevenirea producerii în exces de hormoni tiroidieni, înainte de a trebui să urmaţi o procedură care implică expunerea la iod, cum este o examinare cu substanţe de contrast care conţin iod,
- dacă aveţi o uşoară producere în exces de hormoni tiroidieni, fără alte simptome suplimentare,
- dacă glanda dumneavoastră tiroidă are anumite zone care produc hormoni (adenom autonom),
- dacă aţi avut, mai devreme în cursul vieţii, producere în exces de hormoni tiroidieni.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Mercazolil-Zdorovie

Nu utilizaţi Mercazolil-Zdorovie dacă:
- sunteţi alergic (hipersensibil) la tiamazol, la orice substanţe înrudite (derivaţi de tioamidă) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (vezi pct.6);
- dacă testele de laborator arată că aveţi o reducere a numărului unor anumite celule din sânge (granulocitopenie);
- dacă aveți vezica biliară blocată înainte de începerea tratamentului cu Mercazolil-Zdorovie;

- dacă aţi avut măduva osoasă afectată după tratamentul anterior cu tiamazol sau carbimazol.

Atenţionări şi precauţii
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut înainte reacţii alergice uşoare la tiamazol, cum sunt erupţie trecătoare pe piele de cauză alergică sau mâncărimi. Medicul va decide dacă puteţi să utilizaţi Mercazolil-Zdorovie.
Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi o guşă mare (o umflătură în faţa gâtului), care vă produce dificultăţi la respiraţie, deoarece guşa poate creşte în timpul tratamentului cu Mercazolil-Zdorovie. Medicul dumneavoastră poate decide să prescrie Mercazolil-Zdorovie doar pentru o perioadă limitată şi vă va controla regulat în timpul tratamentului.
Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi simptome cum sunt inflamaţie a mucoasei bucale, dureri în gât sau febră. Acestea pot fi determinate de o reducere marcată a numărului unor anumite celule din sânge (granulocitopenie). Aceasta poate să apară, în special, în primele săptămâni de tratament şi poate duce la consecinţe grave.
Dacă aveţi o formă severă de producere în exces de hormoni tiroidieni, este posibil să utilizaţi doze foarte mari de Mercazolil-Zdorovie (mai mult de 120 mg pe zi). În acest caz, medicul dumneavoastră vă va efectua teste din sânge din când în când, deoarece este posibil ca măduva dumneavoastră osoasă să fie afectată. Dacă se întâmplă aceasta, medicul dumneavoastră poate decide să oprească tratamentul şi, dacă este necesar, vă va recomanda un alt medicament.
Dacă guşa dumneavoastră creşte în timpul tratamentului cu Mercazolil-Zdorovie sau dacă glanda dumneavoastră tiroidă funcţionează sub limita normală, medicul dumneavoastră va trebui să vă verifice doza de Mercazolil-Zdorovie. Oricum, asemenea situaţii pot, de asemenea, să apară datorită cursului natural al bolii dumneavoastră. Similar, un anumit tip de boală a ochilor (oftalmopatie endocrină) poate să apară sau se poate agrava, dar nu este legată de tratamentul cu Mercazolil-Zdorovie.
Este posibil să creşteţi în greutate în timpul tratamentului cu Mercazolil-Zdorovie. Aceasta este o reacţie normală a corpului dumneavoastră. Mercazolil-Zdorovie vă influenţează hormonii tiroidieni, care controlează consumul dumneavoastră de energie.

Mercazolil-Zdorovie împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Cantitatea de iod ingerată de dumneavoastră are un efect asupra modului în care acţionează Mercazolil-Zdorovie – deficitul de iod creşte răspunsul tiroidei la tiamazol, în timp ce excesul de iod scade răspunsul. Medicul dumneavoastră va decide doza de Mercazolil-Zdorovie, în funcţie de cantitatea de iod pe care o ingeraţi şi de funcţia glandei tiroide.
Alte interacţiuni directe cu alte medicamente nu sunt cunoscute.
Cu toate acestea, trebuie luat în consideraţie faptul că metabolizarea şi eliminarea altor medicamente pot fi accelerate în hipertiroidie. Acestea se normalizează pe măsură ce funcţia tiroidiană revine la normal. Dacă este necesar, doza trebuie ajustată.

Mercazolil-Zdorovie împreună cu alimente şi băuturi
Pe durata tratamentului cu Mercazolil-Zdorovie, evitaţi consumul de alcool întrucât efectul hipoglicemic al acestuia poate fi intensificat sau redus de alcool.

Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

În general, sarcina are un efect pozitiv asupra producerii de hormoni tiroidieni. În orice caz,

adresaţi-vă medicului dumneavoastră, deoarece poate fi necesar să continuaţi utilizarea Mercazolil-Zdorovie, în special în primele luni de sarcină. Medicul dumneavoastră poate decide să vă micşoreze doza de Mercazolil-Zdorovie, în scopul evitării oricărui efect dăunător pentru copilul dumneavoastră. Aceasta are, în mod special, importanţă dacă aţi luat Mercazolil-Zdorovie împreună cu hormoni tiroidieni, deoarece o astfel de asociere nu trebuie utilizată în timpul sarcinii.
Aceleaşi lucruri sunt valabile dacă vreţi să alăptaţi. În mod normal, administrarea unor doze de până la 10 mg nu are efecte nocive asupra copilului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va verifica regulat cum funcţionează glanda tiroidă a nou-născutului dumneavoastră.

Conducerea vehiculelorşi folosirea utilajelor
Medicamentul nu influențează asupra capacității de conducere a vehiculelor sau de manevrare a utilajului.

Mercazolil-Zdorovie conţine zahăr.
Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizaţi Mercazolil-Zdorovie
Luaţi întotdeauna Mercazolil-Zdorovie exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală
În funcţie de cât de gravă este boala dumneavoastră, medicul va decide doza dumneavoastră individuală.
De obicei, sunt recomandate următoarele doze:
- *Adulţi*

Doza iniţială este cuprinsă între 10 şi 40 mg Mercazolil-Zdorovie pe zi (sau mai mare la anumiţi pacienţi), până când funcţia tiroidiană revine la normal. Doza de întreţinere este fie cuprinsă între 5 şi 20 mg Mercazolil-Zdorovie pe zi, în asociere cu hormoni tiroidieni, fie între 2,5 şi 10 mg Mercazolil-Zdorovie pe zi, fără hormoni tiroidieni.

- *Copii (cu vârsta peste 3 ani)*

Doza iniţială este de 0,5 mg Mercazolil-Zdorovie pe kg, zilnic. Ulterior, medicul dumneavoastră va decide dacă este suficientă o doză de întreţinere mai mică şi dacă este necesară suplimentarea cu hormoni tiroidieni.

Dacă prezentaţi riscul de apariţie a unei produceri în exces de hormoni tiroidieni, după un test diagnostic cu o substanţă de contrast care conţine iod, medicul dumneavoastră poate să prescrie 10-20 mg Mercazolil-Zdorovie pe zi, împreună cu perclorat, pentru aproximativ 10 zile (până când substanţa de contrast care conţine iod a fost eliminată din organism).

Pacienţi cu afecţiuni ale ficatului
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut tulburări sau boli ale ficatului. În acest caz, doza dumneavoastră de Mercazolil-Zdorovie va trebui redusă.

Pacienţi cu afecţiuni ale rinichilor
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi o tulburare sau o boală a rinichilor. În acest caz, doza dumneavoastră de Mercazolil-Zdorovie va trebui redusă.

Durata tratamentului
Durata tratamentului poate varia, în funcţie de afecţiunea pentru care utilizaţi Mercazolil- Zdorovie. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră cât timp este necesar să utilizaţi acest

medicament. De obicei, durata tratamentului este următoarea:

- tratamentul producerii în exces de hormoni tiroidieni (fără intervenţie chirurgicală): 6 luni-2 ani;
- tratamentul înainte de intervenţia chirurgicală asupra tiroidei: 3-4 săptămâni înainte de intervenţia chirurgicală;
- tratamentul înainte de radioterapia cu iod: până când funcţia dumneavoastră tiroidiană s-a normalizat;
- tratamentul după radioterapia cu iod: 4-6 luni, până când se instalează efectul radioterapiei cu iod.

Mod de administrare

Înghiţiţi comprimatele cu o cantitate suficientă de lichid, cum este o jumătate de pahar cu apă, fără a fi mestecate, dimineaţa, după micul dejun.

Dacă luaţi mai mult de un comprimat pe zi, puteţi, de asemenea, să le luaţi în câteva prize, la intervale regulate, pe parcursul zilei.

Dacă aţi utilizat mai mult Mercazolil-Zdorovie decât trebuie

Dacă, în mod accidental, aţi luat o doză mai mare decât cea prescrisă, nu va fi nicio problemă. Dacă aţi luat mai des doze mai mari decât cea prescrisă, adresaţi-vă medicului imediat ce aţi constatat acest lucru. Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă modifice doza de Mercazolil-Zdorovie sau vă poate prescrie suplimentar hormoni tiroidieni, pentru a evita creşterea guşii.

Dacă aţi uitat să utilizaţi Mercazolil-Zdorovie

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Mercazolil-Zdorovie

Nu întrerupeţi tratamentul, nu modificaţi doza din proprie iniţiativă. Dacă se impune o modificare a tratamentului, consultaţi imediat medicul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Mercazolil-Zdorovie poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În timp ce utilizaţi Mercazolil-Zdorovie, puteţi să aveţi una sau mai multe dintre următoarele reacţii adverse, în unele cazuri chiar după câteva luni de tratament.

Dacă prezentaţi vreuna din următoarele reacţii adverse opriţi administrarea de Mercazolil- Zdorovie şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat:

Reacţii adverse foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi):

- reacţii pe piele de diferite grade (erupţii trecătoare pe piele, mâncărimi, urticarie). Acestea au mai ales o formă moderată şi dispar în timpul terapiei ulterioare.

Reacţii adverse frecvente (afectează până la 1 din 10 pacienţi):

- inflamaţie a mucoasei gurii, dureri în gât sau febră – acestea pot fi semne ale unei reduceri severe a numărului unor anumite celule din sânge (agranulocitoză).

Reacţii adverse rare (afectează până la 1 din 1000 pacienţi):

- reducere a numărului de trombocite (trombocitopenie), reducere a numărului tuturor celulelor din sânge (pancitopenie);

- tulburare a hormonilor care reglează cantitatea de zahăr din sânge, cu scăderea marcată a zahărului din sânge (sindrom autoimun insulinic);
- tulburări sau pierdere a gustului (disgeuzie, ageuzie) care dispar după întreruperea tratamentului (uneori senzațiile gustative se restabilesc peste câteva săptămâni după întreruperea tratamentului);
- febră.

Reacţii adverse foarte rare (afectează până la 1 din 10000 pacienţi):
- boală a ganglionilor limfatici (limfadenopatie generalizată);
- inflamaţii sau iritaţii ale nervilor (nevrită, polineuropatie);
- inflamaţia acută a glandelor salivare;
- disfuncţie sau inflamaţie a ficatului cu coloraţia galbenă a pielii şi mucoaselor (icter colestatic, hepatită toxică). În general, simptomele dispar după oprirea tratamentului;
- reacţii alergice severe pe piele, posibil pe tot corpul, inclusiv dermatită generalizată, cădere a părului, o boală inflamatoare autoimună a pielii şi a ţesutului conjunctiv (lupus eritematos);
- dureri articulare (artralgie), care se dezvoltă treptat, uneori chiar şi peste câteva săptămâni după terapie.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Mercazolil-Zdorovie

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi Mercazolil-Zdorovie după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Mercazolil-Zdorovie
Substanța activă este tiamazolul.
Fiecare comprimat conține tiamazol 5 mg.
Celelalte componente sunt amidon de cartofi, stearat de calciu, zahăr, talc.

Cum arată Mercazolil-Zdorovie și conținutul ambalajului
Mercazolil-Zdorovie se prezintă sub formă de comprimate de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie, cu suprafaţă plată, cu margini teşite.

Mercazolil-Zdorovie este disponibil în cutii cu un flacon din masă plastică a câte 50 sau 100 comprimate.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deţinătorul certificatului de înregistrare
SRL «CORPORAȚIA «ZDOROVIE».
Ucraina, 61013, reg. Harkov, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Fabricantul
SRL «CORPORAȚIA «ZDOROVIE».
Ucraina, 61013, reg. Harkov, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2026.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/.