PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

ALLOCHOL comprimate filmate
Combinație

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea include orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect (vezi pct.4).

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Allochol şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Allochol
3. Cum să luaţi Allochol
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Allochol
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Allochol şi pentru ce se utilizează
Medicamentul dumneavoastră se numește Allochol. Acestea sunt medicamente utilizate pentru patologia biliară. Allocolul îmbunătățește funcția secretorie a celulelor hepatice, provocând un efect coleretic moderat. Stimulează sinteza acizilor biliari; crește gradientul osmotic dintre bilă și sânge, ceea ce duce la o filtrare crescută a apei și electroliților în capilarele biliare; accelerează fluxul de bilă prin canalele biliare, previne răspândirea infecției și reduce intensitatea procesului inflamator; reduce posibilitatea precipitării colesterolului cu formarea ulterioară de calculi.
Allocholul este utilizat ca parte a unui tratament complex de colecistita cronică (inflamaţie a vezicii biliare); dischinezie a vezicii biliare; sindromului postcolecistectomic (simptomele după îndepărtarea chirurgicală a veziculei biliare); constipaţiei atonice (tonusul muscular a intestinului scăzut); colesteroza necomplicată a vezicii biliare (depunerea de colesterol anormal în ţesuturi).
O combinație de patru ingrediente naturale pentru protejarea ficatului și a vezicii biliare, care ajută la îmbunătățirea digestiei.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Allochol
Nu luaţi Allochol, dacă aveţi:
- sunteţi alergic (hipersensibil) la componentele medicamentului (vezi pct.6);
- hepatită acută (inflamaţie a ficatului);
- litiaza biliară;
- icter mecanic (colorare gălbuie a pielii şi a mucoaselor);
- spasmul sfincterului Oddi (impermeabilitatea ductelor biliare şi sucului pancreatic);
- pancreatită acută (inflamaţie a pancreasului);
- ulcer gastric şi duodenal (formarea de defecte pe mucoasa);
- enterocolită acută (inflamaţie a colonului si intestinului subtire).

Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Allochol.

Atenţionări şi precauţii:

Informaţi-l pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist înainte de a vi se administra acest medicament, dacă:
• Aveţi litiază renală.

Dacă nu sunteţi sigur dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Allochol.

Copii și adolescenți.
Acest medicament nu se administrează copiilor.

Allochol împreună cu alte medicamente
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau preparate pe bază de plante medicinale. Acest lucru este important deoarece Allochol poate influenţa acţiunea unor medicamente. De asemenea, anumite medicamente pot influenţa acţiunea Allocholului.
În mod special, spuneţi medicului dumneavoastră sau asistentei medicale dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente:

- coleretice de origine sintetică sau vegetală (medicamente care stimulează ficatul pentru creșterea producției de bilă);
- laxativele;
- vitamine liposolubile;
- antisepticele sau remediile chimioterapice;
- preparatele care conţin hidroxid de aluminiu, holestiramin, colestipol.

Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Administrarea medicamentului în sarcină şi perioada de alăptare e posibilă doar după consultarea medicului, care va determina raportul beneficiu/risc.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu sunt date despre influenţa negativă a medicamentului asupra vitezei reacţiilor psihomotorii în caz de conducere a autovehiculelor şi de manevrare a utilajului.

3. Cum să luaţi Allochol
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul sau asistenta medicală. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Se administrează oral, după mese.

Numărul de zile sau de săptămâni în care vi se va administra Allocholul depinde de tipul bolii pe care o aveţi.

Instrucţiuni pentru utilizarea corectă
Adulţilor li se indică câte 1-2 comprimate de 3-4 ori pe zi după mesă timp de 3-4 săptămâni.
Ulterior – câte 1 comprimat de 2-3 ori pe zi după mesă timp de 1-2 luni.
La necesitate cura de tratament se repetă de 2-3 ori cu interval de 3 luni între curele de tratament.
Primele semne de ameliorare clinică apar la a 5-8 zi de la iniţierea tratamentului

(diminuarea durerilor în hipocondrul drept, dispariţia fenomenelor dispeptice).

Copii
Acest medicament nu se administrează copiilor.

Dacă luaţi mai mult Allochol decât trebuie
Dacă aţi luat mai mult Allochol decât trebuie, anunţaţi imediat medicul dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital. Luaţi acest prospect sau comprimatele produsului cu dumneavoastră pentru ca medicul să ştie ce aţi luat.

S-a raportat că la administrarea îndelungată în doze mai mari decât cele recomandate, pot apărea următoarele simptome: diaree, greață, senzație de mâncărime a pielii, creșterea nivelului transaminazelor în sânge.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitaţi să luaţi Allochol
Dacă aţi uitat să luaţi o doză din medicamentul dumneavoastră, nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Doza uitată trebuie administrată numai dacă intervalul de timp pînă la următoare doză este sufficient de lung.
Luaţi doza următoare la momentul obişnuit.

Dacă încetaţi să luaţi Allochol
Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de a întrerupe utilizarea acestui medicament. Administrarea neregulată sau întreruperea prea devreme a tratamentului pot compromite rezultatul tratamentului sau pot duce la revenirea bolii, a cărui tratament este mai dificil. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile medicului dumneavoastră.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Allochol poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Dacă aveţi o reacţie adversă, adresaţi-vă unui medic.

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută, care sunt:
- manifestări ale sensibilității individuale la componentele medicamentului (reacții alergice),
- diaree.

Reacţii adverse sunt foarte rare şi neînsemnate.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: http://www.amdm.gov.md sau e-mail:farmacovigilenta@amdm.gov.md
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Allochol
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor!
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25 °C.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi medicul dumneavoastră, asistenta medical sau farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Allochol
1 comprimat filmat conţine:
substanţe active: bilă uscată (în recalcul la substanţă anhidră şi compoziţia calitativă a acidului colic) – 80 mg, pulbere de usturoi uscat – 40 mg, frunze mărunţite de urzică – 5 mg, cărbune activat – 25 mg;
Celelalte componente sunt: nucleul: celuloză microcristalină, croscarmeloză de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; filmul: hipromeloză, dioxid de titan (E 171), polietilenglicol (macrogol, PEG 400, PEG 4000), alcool polivinilic, talc, lecitină, galben de chinolină (E 104), indigocarmin (E 132).

Cum arată Allochol şi conţinutul ambalajului
Comprimate filmate de culoare de la galben până la galben-verzuie, rotunde, biconvexe. La secţiunea transversală se vizualizează nucleul, înconjurat de un strat de film.
Câte 10 comprimate filmate în blister din folie de PVC și aluminiu, câte 5 blistere împreună cu prospect pentru utilizator în cutie de carton.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi Fabricantul
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
Centrul Ştiinţific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP,
03134, str. Mira, 17, or. Kiev, Ucraina.

Fabricantul
Centrul Ştiinţific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP,
03134, str. Mira, 17, or. Kiev, Ucraina.

Acest prospect a fost aprobt în aprilie 2026.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/