PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Chlorophyllin-OZ 10 mg/ml soluţie alcoolică
Extractum folia Eucalypti

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Chlorophyllin-OZ şi pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
3. Cum să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Chlorophyllin-OZ şi pentru ce se utilizează
Chlorophyllin-OZ prezintă un amestec de clorofile din frunzele de eucalipt. Preparatul posedă acţiune antibacteriană faţă de stafilococi, inclusiv tulpinile rezistente la antibiotice.
Este utilizat în:
- Tratamentul maladiilor provocate de tulpinile stafilococice rezistente la antibiotice; boala arşilor, ulcere trofice şi ulcere trenante ale membrelor, în tratamentul complex al stărilor septice postoperatorii, postpartum şi de altă geneză; în tratamentul disbiozelor stafilococice ale intestinului şi sanarea purtătorilor de stafilococi, eroziuni ale colului uterin.

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI Chlorophyllin-OZ
Nu utilizaţi Chlorophyllin-OZ
- dacă sunteţi alergic la clorofilipt, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Chlorophyllin-OZ
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Chlorophyllin-OZ împreună cu alte medicamente
Dacă luaţi acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acţiune.
Consultaţi medicul în condiţiile în care mai luaţi:
Potenţează acţiunea antisepticelor.

Se va lua în consideraţie că la prezenţa în rană a resturilor de peroxid de hidrogen Chlorophyllin-OZ se sedimentează. De aceea după lavajul plăgii cu peroxid de hidrogen, plagă se spală cu soluţie 0,9 % de clorură de sodiu sterilă.
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.
Preparatul nu se administrează în sarcină şi perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Deoarece preparatul conţine etanol 96 %, se recomandă respectarea precauţiei la conducerea vehiculelor sau la folosirea utilajelor.

Acest medicament conţine 1484 mg/doză. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii şi grupuri cu risc crescut cum sunt pacienţi cu boli hepatice sau epilepsie.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI Chlorophyllin-OZ
Chlorophyllin-OZ trebuie administrat exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră.
Adulţilor şi copiilor cu vârsta peste 12 ani preparatul se administrează oral, local, sub formă de clisme.
La copii cu vârsta peste 12 ani preparatul se administrează la indicaţia medicului. Pe cale orală Chlorophyllin-OZ se administrează la purtătorii de stafilococi în intestin şi pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii. La adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani se administrează câte 5 ml soluţie alcoolică de 1 % dizolvată în 30 ml apă, de 3 ori pe zi cu 40 de minute până la mese, zilnic.
Durata tratamentului se determină în mod individual în funcţie de eficacitatea tratamentului şi severitatea maladiei.
În tratamentul purtătorilor de stafilococi în intestin Chlorophyllin-OZ se administrează şi sub formă de clisme (câte 20 ml soluţie alcoolică 1 % se dizolvă într-un litru de apă – aceasta este doza pentru o clismă). Procedura se efectuează o dată pe zi.
Clisma cu preparat se efectuează peste fiecare 2 zile.
Cura de tratament constituie 10 proceduri.
Pentru administrarea locală (tratamentul arsurilor şi ulcerelor trofice) soluţia alcoolică 1 % se dizolvă în raport de 1:5 cu soluţie novocainăde 0,25 %.
În tratamentul eroziunii colului uterin în prealabil se usucă cu tifon toate plicele mucoasei vaginale şi păr ţii vaginale ale colului uterin şi se prelucrează cu soluţie de 1 % Chlorophyllin-OZ canalul colului uterin. Pentru irigarea vaginului 15 ml soluţie alcoolică 1 % se dizolvă într-un litru de apă.
Durata tratamentului depinde de evoluţia bolii şi este determinată în mod individual de medic.

Dacă aţi utilizat mai mult Chlorophyllin-OZ decât trebuie
Medicul care vă tratează este instruit pentru a se ocupa de reacţiile adverse grave care pot să apară în cazul administrării unei doze prea mari de Chlorophyllin-OZ. Este posibilă exacerbarea reacţiilor adverse.

Dacă uitaţi să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
Luaţi Chlorophyllin-OZ întreaga perioadă a tratamentului stabilită de medicul dumneavoastră, chiar şi atunci când începeţi să vă simţiţi mai bine.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, Chlorophyllin-OZ poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Dacă prezentaţi vreuna din următoarele reacţii adverse opriţi administrarea de Chlorophyllin-OZ şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat.
Acestea pot fi:
Rare (afectează mai puţin de 1 din 1000 utilizatori):
Erupţii cutanate, prurit, înroșirea pielii, edem angioneurotic (umflarea buzelor, mucoasei nazale, laringelui și etc.)

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: http://www.amdm.gov.md sau email: farmacovigilenta@amdm.gov.md. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Chlorophyllin-OZ
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna şi vederea copiilor!
Nu utilizaţi Chlorophyllin-OZ după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONŢINUTUL AMBALAJULUI ŞI ALTE INFORMAŢII
Ce conţine Chlorophyllin-OZ
1 ml soluție conține:
Substanța activă extract dens de chlorofilipt (10,76:1).
Celălalt component este etanol 93 %.

Cum arată Chlorophyllin-OZ şi conţinutul ambalajului
Cum arată

Chlorophyllin-OZ se prezintă sub formă de lichid transparent de culoare verde.
Ambalaj
Câte 100 ml în flacon de 125 ml de culoare cafeniu închis din polivinil clorid netransparent cu gât filetat și flacon de 125 ml de culoare cafeniu închis din polimer netransparent cu gât filetat.
Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deţinătorul Certificatului de Înregistrare
SRL «CORPORAȚIA «ZDOROVIE».
Ucraina, 61013, reg. Harkov, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Fabricantul
SRL «CORPORAȚIA «ZDOROVIE».
Ucraina, 61013, reg. Harkov, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Acest prospect este revizuit în August 2026.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/