Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient

Chlorophyllin-OZ 2 mg/ml spray bucofaringian/cutanat/vaginal, soluție
Extract dens de clorofilipt

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Chlorophyllin-OZ şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
3. Cum să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Chlorophyllin-OZ şi pentru ce se utilizează
Chlorophyllin-OZ conține în calitate de substanță activă extractul dens de clorofilipt, care prezintă un amestec de clorofile din frunze de eucalipt.
Medicamentul manifestă acţiune antimicrobiană, în special faţă de stafilococi, de asemenea posedă acţiune antiseptică şi antiinflamatoare.

Chlorophyllin-OZ se utilizează pentru tratamentul maladiilor produse de stafilococii rezistenți la antibiotice: eroziuni ale colului uterin, combustii, ulcere trofice, infecţii respiratorii acute (IRA), amigdalite.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
Nu utilizați Chlorophyllin-OZ:
- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la Chlorophyllin-OZ ă, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);

Atenţionări şi precauţii
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.
După prima administrare e necesar de făcut o pauză de 6-8 ore. Tratamentul cu medicament e posibilă după confirmarea lipsei reacțiilor alergice la extractul dens de clorofilipt (posibilitatea edemului buzelor, mucoasei nazale, faringelui și altor reacții alergice). În cazul apariției oricăror dintre aceste simptome, opriți administrarea medicamentului și consultați medicul.

Copii
Experienţa administrării medicamentului la copii lipseşte.

Chlorophyllin-OZ împreună cu alte medicamente
Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, aţi utilizat recent sau

s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Dacă luaţi acest medicament împreună cu altele, se poate schimba modul lor de acţiune. Consultaţi medicul dacă utilizați și alte antiseptice, deoarece Chlorophyllin-OZ le intensifică acțiunea.

Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Eficacitatea și siguranța medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării nu au fost studiate, de aceea medicamentul nu trebuie utilizat la această categorie de pacienți.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu influenţează negativ asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informație importantă privind unele componente ale Chlorophyllin-OZ
Acest medicament conține metilhidroxibenzoat (E 218) și propilhidroxibenzoat (E 216).
Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

3. Cum să utilizaţi Chlorophyllin-OZ

Utilizaţi întotdeauna Chlorophyllin-OZ exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Chlorophyllin-OZ se administrează local: bucofarongian, vaginal, cutanat.

În maladii inflamatoare ale căilor respiratorii superioare (amigdalită, infecţii respiratorii acute) adulţilor se va pulveriza în gât, presând de 2 ori pe valva flaconului, de 3-4 ori pe zi timp de 3-4 zile.

În tratamentul eroziunilor, ulcerelor trofice, combustiilor se va umezi cu Chlorophyllin-OZ o meşă de tifon şi se va aplica pe piele sau mucoase pentru 15-20 min. Procedura se va efectua de 2 ori pe zi, timp de 10 zile, zilnic.

Dacă aţi utilizat mai mult Chlorophyllin-OZ decât trebuie
Medicul care vă tratează este instruit pentru a se ocupa de reacţiile adverse grave care pot să apară în cazul administrării unei doze prea mari de Chlorophyllin-OZ.

Dacă uitaţi să utilizați Chlorophyllin-OZ
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Chlorophyllin-OZ
Utilizați Chlorophyllin-OZ întreaga perioadă a tratamentului, stabilită de medicul dumneavoastră, chiar şi atunci când începeţi să vă simţiţi mai bine.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Chlorophyllin-OZ poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la

toate persoanele.

Dacă apare această reacţie adversă gravă, opriţi utilizarea medicamentului şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră:
- reacţie alergică gravă cu umflare dureroasă a buzelor, limbii, feţei sau gatului şi dificultate bruscă în respiraţie, când vorbiţi sau la înghiţire (edem angioneurotic).

Alte reacţii adverse, care pot apărea pe durata tratamentului cu Chlorophyllin-OZ

Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):
- reacții alergice (posibil întârziate), inclusiv erupţii cutanate, mâncărime, înroșirea pielii;
- dureri de cap, amețeli;
- iritarea mucoasei cavității bucale, grețuri, vomă.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
A se feri de lumina solară directă.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor!

Nu utilizaţi Chlorophyllin-OZ dup ă data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Chlorophyllin-OZ
Substanța activă este extractul dens de clorofilipt.
1 flacon (15 ml soluţie) conţine extract dens de clorofilipt 30 mg.
Celelalte componente sunt: etanol (96%), glicerol, polisorbat-80, metilparahidroxibenzoat (E 218), propilparahidroxibenzoat (E 216), apă purificată.

Cum arată Chlorophyllin-OZ şi conţinutul ambalajului
Chlorophyllin-OZ se prezintă sub formă de lichid opalescent de culoare de la verde-deschis până la verde, cu miros specific.

Chlorophyllin-OZ este disponibil în cutii cu 1 flacon, prevăzut cu pompă dozatoare, care conține 15 ml soluție.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul
Deţinătorul Certificatului de Înregistrare
SRL «CORPORAȚIA «ZDOROVIE».
Ucraina, 61013, reg. Harkov, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Fabricantul
SRL «CORPORAȚIA «ZDOROVIE».
Ucraina, 61013, reg. Harkov, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Acest prospect este revizuit în august 2026.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/