

Urinal® Sirop

Supliment alimentar

Protecție naturală*
*datorită antioxidanților naturali din merișor
Sirop gustos ce poate fi administrat copiilor de peste 1 an.

Vă mulțumim că ați ales **Urinal® Sirop**!

Urinal® Sirop este o altă formă a produsului **Urinal®**, ce conține un ingredient activ important, *Vaccinium macrocarpon* – concentrat uscat din suc de Merișor canadian. Ingredientul activ din **Urinal® Sirop** garantează o cantitate ridicată de compuși fenolici, bioflavonoide și alte substanțe naturale ce asigură calitatea și eficiența produsului. Merișorul canadian are proprietăți antioxidante, prin care apără organismul de efectele nocive ale radicalilor liberi. Cantitatea de extract aferentă porției zilnice maxime (15 ml), corespunde unei cantități minime de 15 mg PAC (proantocianidine).

- **Urinal® Sirop** poate fi administrat copiilor de peste 1 an.
- **Urinal® Sirop** conține concentrat uscat din suc de Merișor canadian și nu are efecte secundare cunoscute.
- **Urinal® Sirop** poate fi administrat în asociere cu tratamentul cu antibiotice.

Calitatea ridicată și eficiența produsului sunt asigurate prin:

- Forma unică de procesare a substanțelor active
- Furnizor de prestigiu de materie primă

Mod de administrare: 5 ml pe zi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 1 și 3 ani, 10 ml pe zi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 3 și 12 ani, 15 ml pe zi pentru copiii de peste 12 ani și adulți.

Urinal® Sirop nu este un înlocuitor al tratamentului cu antibiotice, dar poate fi folosit în paralel cu acestea.

Încercați și alte produse din gama Urinal®:

- **Urinal Akut®**- efect rapid asigurat de forma concentrată; recomandat pe termen scurt.
- **Urinal®** - protecție naturală* (datorită antioxidanților naturali din merișor); recomandat pe termen lung.

Vizitați **www.urinal.ro** pentru mai multe informații despre infecțiile urinare.

Informare:
Multe femei au cel puțin o infecție urinară în timpul vieții lor. În majoritatea cazurilor, infecția urinară este cauzată de bacteria Escherichia Coli. În infecțiile urinare acute persistente, asociate cu febră înaltă este necesară consultarea medicului curant, dacă simptomatologia nu se remite în maximum 48 ore.