PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Moreserc 24 mg comprimate
Betahistinum

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionate în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Moreserc şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Moreserc
3. Cum să utilizaţi Moreserc
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Moreserc
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Moreserc şi pentru ce se utilizează
Betahistina, substanţa activă din Moreserc, ameliorează circulaţia sângelui în urechea internă.
Moreserc este eficace în tratamentul ameţelii (vertijului) provocate de perturbări ale fluxului sanguin în urechea internă.

Moreserc se utilizează pentru tratamentul:
- sindromului Ménière caracterizat prin vertij (cu greaţă/vărsături), surditate (pierderea auzului), tinitus (ţiuituri în urechi).

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Moreserc
Nu utilizaţi Moreserc
- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la betahistină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- dacă aveţi presiune sanguină înaltă datorită tumorii glandei suprarenale (feocromocitom).

Dacă oricare dintre cele menţionate mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră, nu luaţi acest medicament şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Atenţionări şi precauţii
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Moreserc:
- dacă aveţi ulcer la stomac;
- dacă aveţi astm bronşic (o afecţiune a plămânilor însoţită de senzaţie de lipsă de aer);
- dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă;
- dacă alăptaţi.

Dacă oricare dintre cele menţionate mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră, adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament. Medicul dumneavoastră vă va

spune dacă este recomandabil să începeţi utilizarea acestui medicament. Medicul dumneavoastră poate dori, de asemenea, să monitorizeze astmul în timp ce luaţi Moreserc.

Moreserc împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau medicamente din plante.
In special, spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau intenţionaţi să utilizaţi:
- inhibitori MAO, incluzând inhibitori selectivi MAO de tip B (medicamente utilizate în tratamentul depresiei şi bolii Parkinson), deoarece acestea pot creşte durata de acţiune a medicamentului Moreserc
- remedii antihistaminice (antialergice), deoarece interacţiunea dintre betahistină și antihistaminice poate teoretic afecta eficacitatea unuia dintre aceste medicamente.

Moreserc împreună cu alimente, băuturi şi alcool
Puteţi lua Moreserc cu sau fără alimente.

Sarcina, alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Nu luaţi Moreserc dacă sunteţi gravidă decât dacă medicul dumneavoastră consideră că este absolut necesar. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări.
Nu alăptaţi în timp ce utilizaţi Moreserc cu excepţia recomandărilor de către medicul dumneavoastră. Nu se cunoaşte dacă Moreserc trece în laptele matern.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Este puţin probabil ca Moreserc să vă afecteze capacitatea de a conduce autovehicule, de a folosi utilaje sau mecanisme. Totuşi, reţineţi că afecţiunile, pentru care utilizaţi Moreserc (ameţeli, zgomot în urechi şi pierderea auzului (surditate), asociate cu sindromul Méniére) pot influenţa asupra capacităţii dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizaţi Moreserc
Utilizaţi întotdeauna Moreserc exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Înghiţiţi comprimatele cu apă.
Preferabil să luați comprimatele în timpul mesei.

Câte comprimate Moreserc trebuie să luaţi
Luaţi întotdeauna Moreserc aşa cum v-a prescris medicul. Medicul dumneavoastră poate decide care este doza potrivită afecţiunii dumneavoastră.
Doza zilnică recomandată pentru adulți este 24-48 mg.
Moreserc 24 mg comprimate se administrează câte 1 comprimat de 2 ori pe zi.

Continuaţi administrarea medicamentului cât timp v-a recomandat medicul dumneavoastră. Pentru a asigura un rezultat satisfăcător, tratamentul trebuie continuat timp de mai multe luni.

Copii şi adolescenţi
Moreserc nu este recomandat de a fi utilizat de copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 18 ani).

Dacă utilizaţi mai mult Moreserc decât trebuie
Dacă dumneavoastră sau altcineva a luat mai mult decât trebuie din Moreserc (o supradoză), adresaţi-vă imediat medicului sau mergeţi la departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. Nu uitaţi să luaţi cu dumneavoastră ambalajul medicamentului.

Dacă uitaţi să utilizaţi Moreserc
Nu vă îngrijoraţi, omiteţi doza uitată şi utilizaţi doza următoare la momentul corespunzător.
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Moreserc
Continuaţi tratamentul cu Moreserc până când medicul dumneavoastră vă va recomanda întreruperea acestuia. Chiar dacă începeţi să vă simţiţi mai bine, medicul dumneavoastră poate decide să continuaţi tratamentul pentru a se asigura de obţinerea efectului maxim al medicamentului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacţii adverse grave pot să apară în timpul tratamentului cu Moreserc
Reacţii alergice precum:
- umflarea feţei, buzelor, limbii sau gâtului; acest lucru poate determina dificultăți de respirație;
- erupţie pe piele de culoare roşie, mâncărimi ale pielii inflamate.

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse apar ar trebui să opriţi imediat tratamentul şi să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Frecvente (≥1/100 şi <1/10):
Greaţă, indigestie, dureri de cap.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):
Senzaţie de mâncărime, erupţii cutanate, urticarie, acuze gastrice uşoare, cum ar fi vărsături, dureri de stomac şi balonare.
Luând Moreserc cu alimente poate ajuta la reducerea oricăror probleme de stomac.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Moreserc

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalaj original.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Moreserc
Un comprimat conţine: diclorhidrat de betahistină 24 mg.
Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, hidroxipropilceluloză, manitol, acid citric anhidru, talc, siliciu coloidal anhidru.

Cum arată şi conţinutul ambalajului
Comprimate rotunde, de culoare albă, cu incizie pe una din părţi.

Ambalaj:
Moreserc 24 mg. Câte 10 comprimate în blister din PVC/PE/PVDC. Câte 3 sau 10 blistere în cutie de carton.

Deținatorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deținatorul certificatului de înregistrare
Helba İlaç İç ve Dış San. Tic. A.Ş.
Ümraniye – Istanbul, Türkiye /Turcia

Fabricantul
Merkez Laboratuari İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Taşdelen – Çekmeköy Istanbul, Türkiye / Turcia

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2026.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/