PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Adenoprosin 150 mg supozitoare
complexul activ Adenoprosin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Adenoprosin şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Adenoprosin
3. Cum să utilizaţi Adenoprosin
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Adenoprosin
6. Conţinutul ambalajului și alte informaţii

1. Ce este Adenoprosin şi pentru ce se utilizează
Adenoprosin se recomandă bărbaților în tratamentul următoarelor afecțiuni:
- hiperplazia benignă de prostată;
- prostatita cronică (în cadrul tratamentului complex);
- sindromul cronic dureros pelvin;
- stări după intervenţii chirurgicale asupra prostatei.

Hiperplazia benignă de prostată și/sau prostatita cronică poate determina probleme urinare, cum sunt eliminarea cu dificultate a urinei şi necesitatea de a merge frecvent la toaletă. De asemenea, poate determina ca jetul urinar să fie mai lent şi mai slab. Dacă afecţiunea rămâne netratată, există riscul unui blocaj complet al fluxului urinar (retenţie acută de urină).
Preparatul Adenoprosin diminuează permeabilitatea vasculară şi edemul prostatei, reglează tonusul şi peristaltismul segmentelor inferioare ale căilor urinare, micţiunile devenind mai eficiente cu diminuarea frecvenţei, îndeosebi a celor nocturne, cu reducerea disuriei, senzației de golire incompletă a vezicii și tensiune în timpul urinării.
Prin mecanisme patogenetice şi nespecifice, Adenoprosin ameliorează parametrii urodinamici (crește rata maximă a debitului volumic de urină, reduce timpul de urinare, reduce cantitatea de urină reziduală) și starea generală a pacienților cu hiperplazie benignă de prostată (HBP) și prostatită cronică (reduce indicele de prostatită cronică, reduce conținutul de leucocite în secrețiile prostatice, îmbunătățește uniformitatea ecostructurii prostatei).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Adenoprosin
Nu utilizaţi Adenoprosin:
- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la excipient;
- dacă aveți retenție urinară acută (blocaj complet al fluxului urinar);
- dacă sunteţi o femeie (deoarece acest medicament este indicat doar pentru bărbaţi);
- dacă eşti un copil sau un adolescent cu vârsta mai mică de 18 ani.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă credeţi că vreuna dintre afirmaţiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră.

Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizați Adenoprosin, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Asiguraţi-vă că medicul dumneavoastră ştie dacă aveţi afecţiuni severe la rinichi.
Nu trebuie utilizat la copii și adolescenți cu vârsta mai mică de 18 ani.
A se utiliza exclusiv rectal.
Poate provoca prurit anal.
Adresaţi-vă medicului sau farmacistului dacă aveţi orice nelămuriri despre cum să luaţi Adenoprosin.

Adenoprosin împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.

Adenoprosin împreună cu alimente, băuturi şi alcool
Nu este cazul.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
Adenoprosin nu trebuie luat de către femei.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Adenoprosin nu are nicio influență asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Adenoprosin
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Mod de administrare
Rectal.
Doza recomandată este de un supozitor pe zi, preferabil seara la una şi aceeaşi oră, după actul de defecaţie sau clismă. După administrarea supozitorului se recomandă să vă aflați în poziție culcat pe o perioadă de 30-40 minute.
Durata curei de tratament se determină de către medicul curant. Durata tratamentului este de 1 – 3 luni în dependenţă de intensitatea proceselor inflamatorii ale prostatei, gradul şi simptomele de manifestare ale adenomului de prostată şi asocierile lor. În caz de necesitate, la indicaţia medicului cura de tratament poate fi repetată.
Anunțați medicul dumneavoastră dacă vă simțiți mai bine sau mai rău.

Dacă utilizaţi mai mult Adenoprosin decât trebuie
În cazul în care v-aţi administrat o doză mai mare decât cea recomandată, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi Adenoprosin
Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luaţi următoarea doză la timpul stabilit.

Dacă încetaţi să utilizaţi Adenoprosin
Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a întrerupe tratamentul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Pe durata tratamentului pot apărea reacții adverse rare – diaree sau scaun frecvent, cu frecvență necunoscută – prurit anal.
În cazul apariţiei unor astfel de reacţii adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Adenoprosin

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25˚C. A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
Nu utilizaţi Adenoprosin după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului și alte informaţii

Ce conţine Adenoprosin
- Substanţa activă este complexul activ Adenoprosin. Fiecare supozitor conţine 150 mg substanță activă.
- Celelalte componente sunt: ulei de mușețel, gliceride solide de semisinteză.

Cum arată Adenoprosin şi conţinutul ambalajului
Medicamentul se prezintă sub formă de supozitoare de formă cilindrico-conică, de culoare de la galben până la brun.
Adenoprosin este disponibil în cutii de carton cu 2 blistere a câte 5 supozitoare în blister împreună cu prospectul.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare
SC Biotehnos SA
Str. Gorunului, nr. 3-5, Otopeni, jud. Ilfov, România
Telefon: +4(031) 710 24 02
Telefax: +4(031) 710 24 00
E-mail: office@biotehnos.com

Fabricantul
Farmaprim, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,
MD-4829

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2026.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md/

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului certificatului de înregistrare:

Biotehnos S.R.L.
str. Maria Cebotari, 20, mun. Chișinău, MD-2012
Republica Moldova
Telefon: (+373) 22 10 50 68
E-mail: office@biotehnos.md