PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR /PACIENT

FARI VERDE 1,5 mg/ml spray bucofaringian
Clorhidrat de benzidamină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Fari Verde şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Fari Verde
3. Cum să utilizați Fari Verde
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Fari Verde
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Fari Verde şi pentru ce se utilizează
Fari Verde este un medicament ce conține substanța activă numită clorhidrat de benzidamină, care aparţine unui grup de medicamente numite antiinflamatoare nesteroidiene. Aceasta prezintă o activitate antiinflamatorie şi analgezică locală şi are o acţiune anestezică locală asupra mucoasei de la nivelul gurii.

Fari Verde spray bucofaringian, soluţie, este utilizat pentru tratamentul:
- iritației și inflamației mucoasei orofaringiene;
- durerii orofaringiene determinată de gingivită, stomatită, faringită;
- în stomatologie, după extrație dentară sau cu scop profilactic.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Fari Verde
Nu utilizați Fari Verde:
- dacă sunteți hipersensibil (alergic) la clorhidratul de benzidamină sau la oricare dintre excipienţii din compoziția medicamentului, enumerați la punctul 6.

Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizaţi acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:
- dacă sunteți alergic la acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatorii nesteroidiene (AINS), deoarece este posibil să prezentaţi un risc crescut de apariţie a hipersensibilităţii la benzidamină;
- dacă aveţi sau aţi avut vreodată astm bronşic sau boli alergice, deoarece prezentaţi un risc crescut de apariţie a bronhospasmului sau alergiilor.

Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează în maximum 3 zile de la începerea tratamentului, adresaţi-vă medicului dumneavoastră deoarece, în cazuri rare, pot apărea ulceraţii la nivelul gurii sau gâtului determinate de o boală gravă preexistentă.

Nu utilizaţi Fari Verde mai mult de 7 zile fără a vă adresa unui medic.

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului şi întrerupeţi administrarea medicamentului dacă apare o reacţie alergică.
Dacă nu sunteţi sigur că vă aflaţi în oricare dintre situaţiile enumerate mai sus, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să utilizaţi acest medicament.

Copii și adolescenți
Întrebați sfatul medicului înainte de a administra acest medicamente copiilor.
Medicamentul nu se va administra copiilor cu vârsta sub 4 ani.

Fari Verde împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile cu alte medicamente utilizate concomitent.

Fari Verde împreună cu alimente, băuturi şi alcool
Poate apărea o senzaţie de reducere a sensibilităţii sau amorţeală la nivelul cavităţii bucale imediat după administrarea medicamentului. Nu consumaţi alimente sau băuturi înainte ca senzaţia de amorţeală să fi dispărut.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament.

Nu trebuie să utilizați Fari Verde în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar și la recomandarea medicului dumneavoastră. Dacă tratamentul este necesar, trebuie utilizată cea mai mică doză posibilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp.

În prezent, nu există date adecvate disponibile privind utilizarea benzidaminei la femeile care alăptează. Capacitatea acestui medicament de a trece în laptele matern nu a fost studiată.

Fari Verde nu trebuie utilizat în timpul perioadei de alăptare.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Medicamentul nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații privind unele substanțe din compoziția Fari Verde
Acest medicament conține metilparahidroxibenzoat (metilparaben), care poate provoca reacții alergice, chiar întârziate. Acest medicament conține o cantitate mică de etanol (alcool).
Informații pentru sportivi: utilizarea de medicamente care conțin alcool în compoziție, pot determina rezultate pozitive în timpul testelor anti-doping.

3. Cum să luaţi Fari Verde

Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală.
Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doze recomandate
Adulți: câte 4-8 pulverizări de 2-6 ori pe zi.
Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12: câte 4 pulverizări de 2-6 ori pe zi.
Copii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani: câte 1 pulverizare pentru fiecare 4 kg greutate corporală, dar nu mai mult de 4 pulverizări, de 2-6 ori pe zi.

A nu se depăși dozele recomandate. Nu utilizaţi Fari Verde mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului.

Înainte de prima utilizare, trebuie să fie instalat dispozitivul de pulverizare. Pentru a dezamorsa pompa, dispozitivul de pulverizare trebuie apăsat de câteva ori, pentru a obţine o pulverizare uniformă.
Când pompa este apăsată, se formează un aerosol care conține 1 doză de pulverizare - 0,17 ml, ceea ce corespunde la 0,255 mg clorhidrat de benzidamină.

Medicamentul poate fi utilizat la copii cu vârsta peste 4 ani.

Dacă utilizați mai mult Fari Verde decât trebuie
Nu au fost înregistrate cazuri de intoxicație cu Fari Verde atunci când acest medicament a fost utilizat conform recomandărilor din acest prospect. Simptome de intoxicații pot apărea doar dacă au fost înghițite cantități mari de benzidamină, în special la copii. În acest caz pot apărea greața, vărsături, dureri de burtă, iritații ale esofagului, dar pot apărea și alte simptome, determinate de tulburarea sistemului nervos, cum ar fi - posibile amețeli, halucinații, agitație, tremurături, transpirație excesivă, tulburări de coordonare a mișcărilor, neliniște și iritabilitate.
În caz de înghițire a unor cantități mari de medicament, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă indice lavaj gastric, să vă recomande să vă hidratați suficient, sau vă va indica medicamente care vor ameliora echilibrul sărurilor în organismul dumneavoastră sau vor ameliora alte simptome pe care le dezvoltați.

Dacă aţi utilizat sau credeţi că aţi utilizat mai mult Fari Verde decât trebuie (supradozaj) și prezentaţi orice simptom neobișnuit, spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau prezentaţi-vă la cea mai apropiată unitate medicală. Luați medicamentul, cutia sau prospectul cu dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizați Fari Verde
Dacă uitaţi să utilizați medicamentul sau aţi utilizat o doză mai mică decât cea recomandată de medicul dumneavoastră nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să administrați Fari Verde
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cazuri cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile), pot apărea reacții adverse alergice grave - șoc anafilactic și bronhospasm - ale cărei semne pot include dificultăți la respirație, durere în piept sau senzație de apăsare în piept și/sau senzație de amețeală/leșin, mâncărimi severe ale pielii sau umflături apărute pe piele, umflare a feței, buzelor, limbii și/sau gâtului și care poate pune viața în pericol.
Dacă manifestați oricare dintre semnele sau simptomele menționate mai sus, întrerupeți utilizarea medicamentului solicitați imediat asistență medicală.

În timpul utilizării acestui medicament pot apărea următoarele reacții adverse:

Reacţiile adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) sunt:
- sensibilitate la lumină;

Reacţiile adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):
- reacții alergice (hipersensibilitate);
- senzație de arsură și uscăciune în cavitatea bucală.

Reacţiile adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 persoane):
- spasm al laringelui, edem angioneurotic (umflarea pleoapelor, feţei sau buzelor).

Cu frecventă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):
- reducerea sensibilității sau senzație de amorțeală la nivelul gurii;
- grețuri, vărsături;
- umflături și decolorarea limbii;
- modificarea gustului;
- reacții alergice grave (reacții anafilactice);
- bronhospasm (respirație dificilă);
- erupții cutanate;
- mâncărimi, urticarie;
- amețeli, durere de cap.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă, sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Fari Verde
A se păstra la temperaturi sub 25°C.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Fari Verde

Substanţa activă este clorhidratul de benzidamină. 1 ml soluție conţine 1,5 mg clorhidrat de benzidamină.
Celelalte componente sunt: zaharină, hidrogenocarbonat de sodiu, polisorbat 20, aromatizator mentă, metilparaben (E218), glicerină, etanol 96%, apă purificată.

Cum arată Fari Verde și conținutul ambalajului

Fari Verde se prezintă sub formă de soluție transparentă, incoloră, cu aromă caracteristică.

Fari Verde este disponibil câte 30 ml soluție în flacoane etanș închise cu capac prevăzut cu dispozitiv de pulverizare sau câte 30 ml soluție în flacoane etanș închise cu capac și căpăcel, prevăzut cu dispozitiv de pulverizare. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie din carton.

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul

Deţinătorul certificatului de înregistrare
Întreprinderea mixtă Ucraineană-Spaniolă „Sperco Ucraina”
str. 600-letia 25, or. Vinniţa 21027, Ucraina
Tel.: +380 (0432) 52-30-36
e-mail: trade@sperco.com.ua

Fabricantul
Întreprinderea mixtă Ucraineană-Spaniolă „Sperco Ucraina”
str. 600-letia 25, or. Vinniţa 21027,
Ucraina

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2026

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md